

188 mm

NeshCálcio

carbonato de cálcio 1250mg
equivalente a 500mg de cálcio
elementar/comprimido

NF Nunesfarma
Saúde. Tradução. Inovação.

APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: Comprimidos simples
Cartucho contendo 6 blisters contendo 10 comprimidos cada
Cartucho contendo 20 blisters contendo 10 comprimidos cada

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

Carbonato de cálcio 1250 mg
(Equivalente a 500 mg de cálcio elementar)
Excipientes q.s.p 1 comprimido
(amido, celulose-microcristalina, lactose-monoidratada, sacarose, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, laurilsulfato de sódio)

Componentes do NeshCálcio	Dose diária fornecida por 3 (três) comprimidos	% IDR* (RDC 269/05)
		Adultos
Carbonato de cálcio	3.750 mg (equivalente a 1.500 mg de cálcio elementar)	150%

*% IDR = Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NeshCálcio está indicado como suplemento mineral em dietas restritivas e inadequadas.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cálcio exerce inúmeras funções no organismo (dentro e fora das células) e como importante componente das estruturas ósseas. Os ossos servem como reserva para esse mineral, portanto, a falta de cálcio faz com que sejam utilizadas essas reservas causando a desmineralização (enfraquecimento) dos ossos. Em casos de carência de cálcio há a necessidade de reposição, bem como em fase de crescimento já que normalmente o corpo humano nasce com 25-30 g de cálcio e durante a maturidade chega entre 10 e 15 kg de cálcio. Toda essa diferença de cálcio vem da dieta, sendo este um nutriente essencial. O cálcio é rapidamente absorvido pelo organismo e a maior parte é excretada pelas fezes. Também é filtrado pelos rins e eliminado pelo suor.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O carbonato de Cálcio é contraindicado em condições como hipercalemia (excesso de cálcio no organismo), hipertireoidismo, hipercaleiúria (excesso de excreção de cálcio na urina), nefrolitíase (doença renal) e Síndrome de Zollinger-ellison ou em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes deste medicamento.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

O QUE DEVO SABER ANTES USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Durante terapias de alta dosagem e essencialmente durante o tratamento realizado ao mesmo tempo com vitamina D e/ou medicações ou nutrientes (como leite) contendo cálcio, existe um risco de hipercalemia (excesso de cálcio no organismo) com subsequente impacto na função dos rins ou síndrome do leite-alkalino. Nestes pacientes, o nível de cálcio no sangue deve ser acompanhado, e a função renal monitorada por médicos. Este medicamento deve ser evitado por pacientes que apresentem alguma das seguintes condições: constipação, desidratação, níveis altos de cálcio no sangue, doença dos rins, sangramento estomacal, obstrução ou úlcera, alguma reação não usual ou alérgica ao carbonato de cálcio, outros medicamentos, comida, corantes ou conservantes. Também é contraindicado em casos de gravidez e amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. **Atenção diabéticos: contém açúcar.**

INTERAÇÕES

Diuréticos Tiazídicos (como hidroclortiazida, clortalidona e indapamida) reduzem a excreção urinária de cálcio e por isso aumentam o risco de ocasionar excesso de cálcio no organismo, sendo necessário monitorar os níveis de cálcio no sangue. Corticosteróides sistêmicos reduzem a absorção do cálcio. Durante o uso concomitante pode ser necessário que o médico aumente a dose de comprimidos de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio pode interferir na absorção de preparações de tetraciclina administradas ao mesmo tempo. Por esta razão, as preparações de tetraciclina devem ser administradas pelo menos duas horas antes, ou quatro a seis horas depois, da ingestão de cálcio. A hipercalemia (excesso de cálcio no organismo) pode aumentar a toxicidade de glicosídeos cardíacos durante o tratamento com cálcio. Os pacientes devem ser monitorados por eletrocardiograma

Front

188 mm

(ECG) e os níveis de cálcio no sangue. A eficácia da levotiroxina pode ser reduzida pelo uso concomitante de cálcio, devido à diminuição na absorção da levotiroxina. A administração de cálcio e levotiroxina deve ser separada, por pelo menos quatro horas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Proteger da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 36 meses, indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O medicamento NeshCálcio se apresenta como comprimidos não revestidos brancos a quase brancos, alongados, biconvexos, contendo sulco em um dos lados.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 3 (três) comprimidos ao dia. Este medicamento deve ser utilizado apenas pela via oral. O uso deste medicamento por outra via que não a oral, pode resultar na perda do efeito esperado do medicamento ou mesmo provocar danos à saúde.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Metabolismo e desordens nutricionais: são incomuns mas pode ocorrer hipercalemia (excesso de cálcio no organismo) e hipercaleiúria (excesso de excreção de cálcio na urina).

Desordens gastrointestinais: são raras mas pode ocorrer constipação, náusea (enjoo), dor abdominal e diarreia. **Desordens de pele e subcutâneas:** também são raras mas pode ocorrer prurido, rash cutâneo (Erupções na pele) e urticária. Outros efeitos indesejáveis são inchaço na face, lábios ou língua, confusão ou irritabilidade, dor de cabeça, perda de apetite, náusea, vômito, fraqueza não usual ou constipação e gases estomacais.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de usar uma quantidade maior de a indicada, interrompa o uso do medicamento e procure ajuda médica para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

MS: 1.1795.0004

Importado por: **Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda**

Rua Almirante Gonçalves, 2247 • Água Verde

CEP: 80250-150 • Curitiba/PR

CNPJ: 75.014.167/0001-00

SAC: (41) 2141-4100

Responsável Técnico:

Pâmela Fernandes Kaseker • CRF-PR n° 16.297

Fabricado por: **Medicamen Biotech Ltd**

SP-1192, A&B, Phase-IV- Industrial Area Bhiwadi 301019,

Alwar District, Rajasthan, India.

Telefones: + 91 11 27240578, 27240610 e 27463506

Fax: +91 11 27138171

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (29/08/2016).

BUNCP01 - 188x218mm - 8.16(A)

Back